



INFORMOVANÝ SOUHLAS k porodnickému výkonu

Pacient: _____ ČP: _____ Poj.: _____ Č. chor.: _____

A - Účel, důvod zákroku (vyšetření)

viz informace na 2.straně listu

B - Pacientův stav vyžaduje následující zákrok (vyšetření)

- Spontánní porod
- Císařský řez
- Porod koncem pánevním
- Porod dvojčat
- Manuální lyze
- Indukce porodu
- Cerclage
- Resutura
- Porodní analgezie
- Porodnický obrat

C - Rizika zákroku (vyšetření)

(existují určitá rizika, která jsou spojena s tímto typem zákroku (vyšetření))

- Krvácení a poranění okolních orgánů během operace, např. močového měchýře, močovodů, tlustého nebo tenkého střeva apod. Tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo k opakování operace.
- Trombóza, tj. vytvoření krevních sraženin v žilách a embolie, tj. zanesení těchto sraženin např. do plic, kde může dojít k život ohrožujícímu uzavření cévního řečiště
- Infekce operační rány nebo močových cest
- Komplikace spojené s celkovou anestézií - nevolnost, bolest v krku; nebo místní (epidurální, spinální) anestézií - bolesti hlavy, krvácení, eventuálně zanesení infekce v místě vpichu, poranění míšního kořene
- Alergické reakce
-

D - Jiné relevantní možnosti léčby a jejich rizika

- jsou uvedeny na druhé straně listu
-

E - Další důležité informace ke snížení rizika komplikací (pokud ANO, označte, případně uveďte jaké)

F - Co může udělat sám(a) pacient(ka) pro prevenci komplikací

- Dodržování léčebného i dietního režimu
- Časné vstávání, mobilizace a rehabilitace po operaci jsou nejlepší prevencí trombózy a embolie, pomáhají obnovit pohybu střev a tím snižují možnost vzniku pooperačních srůstů a bolestí
- Dostatečný příjem tekutin (nejméně 2-3 litry denně) podporuje hojení, pohyby střev, předchází zánětům močových cest, prevence trombózy
- Včasné informování zdravotního personálu o Vašich případných potížích zabrání rozvoji možných komplikací

G - Pacientův informovaný souhlas

Já, níže podepsaný pacient, potvrzuji:

- že mi lékař vysvětlil můj zdravotní stav a navrhovaný zákrok. Jsem srozuměn s riziky, které jsou s tímto zákrokem spojeny a s riziky, které jsou specifické s ohledem na můj zdravotní stav
- že mě lékař seznámil s možnými alternativami a možnými riziky zákroku
- že mě lékař seznámil s informacemi a riziky týkajícími se anestézie
- že jsem srozuměn s tím, že procedura může vyžadovat transfuzi krve
- že jsem srozuměn s tím, že neexistuje záruka toho, že zákrok změní můj zdravotní stav k lepšímu, i s tím, že zákrok může můj zdravotní stav zhoršit
- že jsem měl(a) možnost přečíst si informační leták o účelu, povaze zákroku, jeho důsledcích, rizicích a alternativách
- bylo mi umožněno položit lékaři otázky týkající se mého zdravotního stavu, plánované procedury, případných dalších rizik a možných alternativ. Otázky byly zodpovězeny lékařem k mé spokojenosti
- že jsem nezamířel žádné informace o svém zdravotním stavu, které by mohly mít vliv na operační výkon i pooperační průběh
- že jsem srozuměn s tím, že zákrok může provést i někdo jiný než můj ošetřující lékař

Na základě výše uvedeného prohlášení jsem se rozhodl(a) požádat o výše uvedený zákrok (vyšetření).

Datum: _____ Podpis pacienta nebo jeho zákonného zástupce: _____

H - Prohlášení lékaře

Seznámil jsem pacienta s jeho zdravotním stavem, potřebou léčebného zákroku (diagnostického vyšetření) a riziky spojené s realizací tohoto zákroku (vyšetření), s relevantními léčebnými alternativami a jejich riziky, s následky v případě, že se rizika realizují, specifickými riziky pro tohoto pacienta a následky v případě, že se pacient zákroku (vyšetření) nepodrobí. Dal jsem příležitost pacientovi (popř. jeho zástupci) položit otázky týkající se výše uvedených záležitostí nebo otázky týkající se jeho jiných obav. Na dané otázky jsem odpověděl srozumitelně, v potřebném rozsahu a co nejlépe. Jsem přesvědčen o tom, že pacient pochopil výše uvedené informace tak, aby byl schopen se informovaně rozhodnout.

Datum: _____ Jméno lékaře: _____ Podpis lékaře: _____

Indukce - vyvolání porodu

Abyste se mohla zodpovědně rozhodnout k navrhovanému postupu, informujeme Vás prostřednictvím tohoto záznamu a pohovorem s lékařem/kou o důvodu, způsobech a případných rizicích této metody.

1. Definice indukce porodu:

Jedná se o umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství. Porod se indukuje v případech, kdy pokračování těhotenství zvyšuje riziko poškození matky a/nebo plodu.

Indukce neřeší primární příčinu, ale včasným ukončením těhotenství může zabránit poškození plodu nebo zlepšit stav pacientky. Patří tedy k metodám preventivním.

Programovaný porod je indukce porodu v termínu porodu na přání pacientky a bez lékařské indikace.

2. Nejčastější důvody k indukci porodu:

- potermínová gravidita
- diabetes mellitus
- odtok plodové vody
- Rh-izoimunizace
- hypertenzní a ledvinné onemocnění
- prohlubující se opoždění růstu plodu
- gemini
- konec pánevní úplný
- mrtvý plod, zatížená porodnická anamnéza, ev. programovaný porod

3. Metody indukce porodu:

- a) mechanické – spočívají v uvolnění dolního pólu vaku blan prstem porodníka event. v protržení vaku blan při pokročilejším nálezu.
Renesanci zažívá metoda zavedení tyčinek způsobujících osmotické rozšíření děložního hrdla (Dilapan).
- b) farmakologické tj. podání účinných léků pro vyvolání porodních stahů - Oxytocin, aplikace prostaglandinů do děložního hrdla nebo poševní klenby.
Při nedostatečné zralosti porodních cest se provádí farmakologicky prostaglandiny indukce jejich zralostí tzv. preindukce 1-2 dny před samotnou indukcí porodu.

4. Možné komplikace:

Nepřavidelná děložní činnost, nitroděložní známky nedostatečného zásobení plodu kyslíkem. Tyto komplikace se mohou objevit asi u 20% případů při vyvolání porodní činnosti a vyžadují pak operační ukončení porodu. V převážně většině případů ani nejde o komplikaci této metody, ale o nitroděložní tíseň následkem děložních stahů, která by se projevila i při samovolném porodu.

Ojedinele může při indukci po předchozím císařském řezu nastat situace, kdy následkem nekoordinované děložní činnosti hrozí roztržení šití dělohy po tomto řezu. Tuto situaci však porodník včas odhalí a porod ukončí opět císařským řezem.

Je velmi vhodné, aby byla rodička při indukci porodu lačná!